



SIMEUP


Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica

MANOVRA PER LA VITA

SEQUENZA DI DISOSTRUZIONE DA CORPO ESTRANEO NEL LATTANTE (FINO AD 1 ANNO)

Se ostruzione **PARZIALE** delle vie aeree cioè il lattante riesce a piangere, a tossire, a emettere suoni **non eseguire alcuna manovra di disostruzione**, ma incoraggiarlo a tossire e a mantenere la posizione che preferisce. Se persiste difficoltà respiratoria, attivare subito il 118 o trasportare il lattante in Pronto Soccorso.

Se ostruzione **COMPLETA** delle vie aeree, cioè il lattante non riesce a piangere, a tossire e a emettere suoni finchè rimane **COSCIENTE** eseguire la SEQUENZA:



1 Allerta il 118



PACCHE DORSALI

2

LATTANTE COSCIENTE:

alterna **5 pacche dorsali** a **5 compressioni toraciche** con 2 dita fino a disostruzione

5

COMPRESSIONI TORACICHE

SE IL LATTANTE DIVENTA **INCOSCIENTE**, ESEGUI LA SEQUENZA:



1 Posiziona il paziente su un piano rigido



2 Allerta il 118 senza abbandonare il paziente



4 Solleva la lingua-mandibola ed esegui lo svuotamento digitale del cavo orale (se corpo estraneo affiorante)



3 Inizia Rianimazione Cardio-Polmonare RCP (30 compressioni toraciche alternate a 2 ventilazioni bocca-bocca/naso in 2 minuti)



5 Prosegui RCP in attesa del soccorso avanzato

A cura di Stefania Zampogna
Contributo alla realizzazione e progettazione: Concetta Procopio
Realizzazione e creazione grafica a cura di Umberto Cannistrà

Tutti i diritti sono riservati. Copyright© 2012
E' severamente vietata la duplicazione o la copia anche parziale di qualsiasi contenuto.



SIMEUP

Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica

MANOVRA PER LA VITA

SEQUENZA DI DISOSTRUZIONE DA CORPO ESTRANEO NEL BAMBINO (OLTRE AD 1 ANNO)

Se ostruzione **PARZIALE** delle vie aeree cioè il lattante riesce a piangere, a tossire, a parlare **non eseguire alcuna manovra di disostruzione**, ma incoraggiarlo a tossire e a mantenere la posizione che preferisce.

Se persiste difficoltà respiratoria, attivare subito il 118 o trasportare il bambino in Pronto Soccorso.

Se ostruzione **COMPLETA** delle vie aeree, cioè il bambino non riesce a piangere, a tossire e a parlare finchè rimane **COSCIENTE** eseguire la SEQUENZA:



1

Allerta il 118



2

Esegui compressioni sottodiaframmatiche (manovra di Heimlich) fino a disostruzione

SE IL BAMBINO DIVENTA **INCOSCIENTE**, ESEGUI LA SEQUENZA:

1



Posiziona il paziente su un piano rigido

2



Allerta il 118 senza abbandonare il paziente

4



Solleva la lingua-mandibola ed esegui lo svuotamento digitale del cavo orale (se corpo estraneo affiorante)

3



Inizia Rianimazione Cardio-Polmonare RCP (30 compressioni toraciche alternate a 2 ventilazioni bocca-bocca chiudendo le narici con due dita, in 2 minuti)

5



Prosegui RCP in attesa del soccorso avanzato

A cura di Stefania Zampogna

Contributo alla realizzazione e progettazione: Concetta Procopio

Realizzazione e creazione grafica a cura di Umberto Cannistrà

Tutti i diritti sono riservati. Copyright© 2012

E' severamente vietata la duplicazione o la copia anche parziale di qualsiasi contenuto.